



Vaccine Supply

type	ขวด	Dose
SinoVac	729,120	729,120
AstraZeneca	79,661	796,610
Pfizer	54,355	326,130
Sinopharm	31,600	31,600
Moderna	3,572	53,580
รวม		1,937,040

ผลงานการให้บริการ

เข็ม 1	1,011,833 เข็ม
เข็ม 2	810,963 เข็ม
เข็ม 3	33,359 เข็ม
รวม	1,856,155 เข็ม



ผลงานสะสม

เข็ม 1 1,011,833 dose

53.81%

+0.45

เข็ม 2 810,963 dose

43.13%

80.15%

+0.3

ทะเบียนราษฎร์


เข็ม 1

-0.11


ผลงานรายวัน 2 ร.ค.64

ผลงานฉีดวัคซีนรายวัน วันที่ 2 ธันวาคม 2564					
hcode	ชื่อหน่วยให้บริการ	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	รวม
10669	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	728	319	498	1,545
10944	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	174	296	-	470
10945	รพ.โขงเจียม	140	4	16	160
10946	รพ.โขงใน	355	99	-	454
10947	โรงพยาบาลเขมราฐ	307	162	6	475
10948	โรงพยาบาลนาจะหลวย	379	190	18	587
10949	โรงพยาบาลน้ำยืน	419	6	3	428
10950	โรงพยาบาลบุณฑริก	540	146	17	703
10951	โรงพยาบาลตระการพืชผล	556	210	5	771
10952	โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น	286	90	1	377
10953	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ	211	43	3	257
10954	โรงพยาบาลวารินชำราบ	447	233	86	766
10956	โรงพยาบาลพินุลมังสาหาร	347	39	13	399
10957	โรงพยาบาลตาลชุม	122	89	1	212
10958	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	64	11	2	77
10959	โรงพยาบาลสำโรง	93	179	-	272
10960	โรงพยาบาลดอนมดแดง	34	7	1	42
10961	โรงพยาบาลสิรินธร	92	70	1	163
10962	โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	163	274	5	442
11443	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	439	548	31	1,018
11495	โรงพยาบาลกองบิน 21	-	-	-	-
11496	โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (สโม)	-	1	-	1
11918	รพ.เอกชนร่มเกล้า	-	-	-	-
11919	โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี	10	7	-	17
11920	โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี	-	-	-	-
12269	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	-	12	-	12
12270	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่	-	-	-	-
14201	โรงพยาบาลมะเร็งบูลราชธานี	-	-	-	-
15078	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	-	-	-	-
21984	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ	80	78	2	160
24032	รพ.นาตาล	108	31	13	152
24821	รพ.นาเยีย	144	257	8	409
27967	โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์	291	247	42	580
27968	โรงพยาบาลน้ำขุ่น	24	24	8	56
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	27	4	1	32
40864	โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี	170	343	-	513
41674	รพ.ชีวมิตรา	-	-	-	-
	รวม	6,750	4,019	781	11,550
		58.44			

อัตราการฉีดวัคซีนประชาชนทะเบียนราษฎร์ รายอำเภอ



อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 รายอำเภอ



ผลงานการให้บริการวัดขึ้นเข็ม 1			
เทียบเป้าหมายประชากรอยู่จริง(Typearea 1 , 3) 12 ปีขึ้นไป รายอำเภอ			
อำเภอ	ปชก.type 1,3 ทั้งหมด	ผลงานเข็ม 1	ร้อยละ
ม่วงสามสิบ	49,250	39,356	79.91
ดอนมดแดง	15,768	11,435	72.52
ทุ่งศรีอุดม	17,527	12,168	69.42
น้ำขุ่น	18,989	13,120	69.09
ตระการพืชผล	71,214	48,422	68.00
สำโรง	38,417	26,052	67.81
เหล่าเสือโก้ก	18,858	12,778	67.76
กุดข้าวปุ้น	21,356	14,182	66.41
เดชอุดม	113,256	74,820	66.06
สว่างวีระวงศ์	18,877	12,463	66.02
นาเยีย	18,907	12,329	65.21
ตาลชุม	17,841	11,586	64.94
ศรีเมืองใหม่	47,540	30,388	63.92
นาตาล	23,609	14,844	62.87
เมือง	152,212	94,183	61.88
พิบูลมังสาหาร	84,676	52,368	61.85
วารินชำราบ	110,415	67,147	60.81
เขื่องใน	71,310	43,064	60.39
บุญเทrik	59,467	35,124	59.06
น้ำยืน	45,424	26,744	58.88
โขงเจียม	24,967	14,588	58.43
โพธิ์ไทร	31,567	18,280	57.91
นาจะหลวย	40,041	22,211	55.47
สิรินธร	38,441	20,905	54.38
เขมราฐ	59,850	32,182	53.77
Grand Total	1,209,779	760,739	62.88

การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ในนักเรียน/นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564

Search:



โรงเรียน	จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่อายุ เข้าเกณฑ์(คน)	เข็ม 1 (คน)	%	เข็ม 2 (คน)
1034710001:อุบลวิทยาคม	188	162	86.17	
1034710002:มูลนิธิวัดศรีอุบล รัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา	183	156	85.25	
1034710003:อนุบาลอุบลราชธานี	273	248	90.84	2
1034710004:ปทุมวิทยากร	767	616	80.31	52
1034710005:บ้านปากห้วยวังนอง	19	4	21.05	
1034710006:วัดท่าวังหิน	2	0	0.00	
1034710007:กองบินอุบล สงเคราะห์	0	0	0.00	
1034710009:บ้านท่าบ่อ	102	80	78.43	5
1034710010:บ้านคูเต่า	8	0	0.00	
1034710011:โรงเรียนบ้าน...	2	1	50.00	

เป้าหมาย
143,565
[คน]

เข็ม 1
121,423
[84.58%]

เข็ม 2
93,958
[65.45%]

ระดับชั้น	จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่อายุ เข้าเกณฑ์(คน)	เข็ม 1 (คน)	%	เข็ม 2 (คน)	%
อนุบาล	10	1	10.00	1	10.00
ประถมศึกษา	16,338	11,606	71.04	6,207	37.99
มัธยมศึกษาตอนต้น	61,872	54,933	88.78	42,744	69.08
มัธยมศึกษาตอนปลาย	53,279	46,433	87.15	38,772	72.77
อนุปริญญา	11,850	8,288	69.94	6,101	51.49
ปริญญาตรี	213	161	75.59	132	61.97
รวม	143,562	121,422	84.58	93,957	65.45

ผลงานการให้บริการวัคซีนโควิด-19 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา

ลำดับ	อำเภอ	เป้าหมาย	เข็ม 1	ร้อยละ	เข็ม 2	ร้อยละ เทียบเป้าหมาย	ร้อยละ เทียบเข็ม 1
1	เมืองอุบลราชธานี	35,509	30,218	85.10	24,670	69.48	81.64
2	ศรีเมืองใหม่	4,848	4,312	88.94	3,658	75.45	84.83
3	โขงเจียม	2,158	1,745	80.86	1,313	60.84	75.24
4	เขื่องใน	6,035	4,931	81.71	4,195	69.51	85.07
5	เขมราฐ	8,653	6,820	78.82	5,405	62.46	79.25
6	เดชอุดม	15,016	12,906	85.95	8,615	57.37	66.75
7	นาจะหลวย	3,819	3,276	85.78	2,622	68.66	80.04
8	น้ำยืน	5,983	4,716	78.82	3,364	56.23	71.33
9	บุณฑริก	6,595	5,248	79.58	2,724	41.30	51.91
10	ตระการพืชผล	9,396	8,193	87.20	6,546	69.67	79.90
11	กุดข้าวปุ้น	1,977	1,695	85.74	1,394	70.51	82.24
12	ม่วงสามสิบ	4,277	3,944	92.21	3,518	82.25	89.20
13	วารินชำราบ	9,613	8,251	85.83	6,506	67.68	78.85
14	พิบูลมังสาหาร	11,037	9,164	83.03	6,644	60.20	72.50
15	ตาลชุม	1,557	1,284	82.47	1,009	64.80	78.58
16	โพธิ์ไทร	2,276	1,927	84.67	1,665	73.15	86.40
17	สำโรง	2,453	2,271	92.58	2,042	83.25	89.92
18	ดอนมดแดง	1,163	1,069	91.92	836	71.88	78.20
19	สิรินธร	2,987	2,326	77.87	1,669	55.88	71.75
20	ทุ่งศรีอุดม	1,526	1,356	88.86	1,044	68.41	76.99
21	นาเยี่ย	1,633	1,399	85.67	873	53.46	62.40
22	นาตาล	2,283	2,019	88.44	1,677	73.46	83.06
23	เหล่าเสือโก้ก	1,101	1,019	92.55	869	78.93	85.28
24	สว่างวีระวงศ์	877	745	84.95	631	71.95	84.70
25	น้ำขุ่น	793	589	74.27	469	59.14	79.63
	รวม	143,565	121,423	84.58	93,958	65.45	77.38

อสม.ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน			
อำเภอ	อสม.ทั้งหมด	ยังไม่ได้รับวัคซีน	ร้อยละ
นาจะหลวย	1,126	110	9.77
เมืองอุบลราชธานี	4,021	375	9.33
น้ำขุ่น	726	59	8.13
นาตาล	764	60	7.85
น้ำยืน	1,316	103	7.83
เขื่องใน	2,387	184	7.71
วารินชำราบ	2,822	212	7.51
บุญเทrik	1,725	123	7.13
โขงเจียม	703	45	6.40
สว่างวีระวงศ์	584	34	5.82
โพธิ์ไทร	889	51	5.74
ศรีเมืองใหม่	1,293	69	5.34
ดอนมดแดง	485	25	5.15
สำโรง	1,016	50	4.92
นาเยีย	507	24	4.73
พิบูลมังสาหาร	2,748	129	4.69
ตระการพืชผล	2,159	97	4.49
กุดข้าวปุ้น	777	34	4.38
สิรินธร	960	41	4.27
ม่วงสามสิบ	1,732	73	4.21
เดชอุดม	3,432	141	4.11
เขมราฐ	1,436	48	3.34
เหล่าเสือโก้ก	508	15	2.95
ตาลชุม	591	16	2.71
ทุ่งศรีอุดม	562	9	1.60
(blank)	24	3	12.50
Grand Total	35,293	2,130	6.04
ข้อมูลวันที่ 1 ธ.ค.64 เวลา 15.30 น.			

คนอุบลฯ อยากได้สูตรไหน เราจัดให้.....

เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	ระยะห่าง
 sinovac	 sinovac	AstraZeneca 	8 สัปดาห์ หลังเข็ม 2
 sinovac	 sinovac	moderna 	8 สัปดาห์ หลังเข็ม 2
 SINOPHARM	 SINOPHARM	AstraZeneca  moderna 	8 สัปดาห์ หลังเข็ม 2
AstraZeneca 	AstraZeneca 	moderna 	6 เดือน หลังเข็ม 2
 sinovac	AstraZeneca 	AstraZeneca  moderna 	3 เดือน หลังเข็ม 2
AstraZeneca 	moderna 	ยังไม่กระตุ้น	
moderna 	AstraZeneca  	ยังไม่กระตุ้น	
		ยังไม่กระตุ้น	
 ป่วย COVID	AstraZeneca  moderna 		3 เดือน หลังป่วย COVID

- กรณี Moderna บริการระหว่างวันที่ 1 – 15 ธ.ค.64
- Pfizer เข็ม 1 บริการระหว่างวันที่ 1 – 5 ธ.ค.64



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อคนไทยปลอดภัย
ประเทศไทยปลอดภัย



ขั้นตอนการดำเนินการ MOPH Certificate



ขั้นที่ 1

สำหรับผู้ประสานงานของโรงพยาบาล



โรงพยาบาล Scan QR code เพื่อลงทะเบียน



ข้อควรระวัง : กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด
(จะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง)



ได้ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาล

ขั้นที่ 2

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผู้มีอำนาจลงนาม



แพทย์ Scan QR code
เพื่อลงทะเบียน OneID
<https://one.th/register>
(ต้องจำ User/Password)



แพทย์ Scan QR code
เพื่อสร้างลายเซ็นดิจิทัล
สำหรับผู้ลงนาม และเจ้าหน้าที่



รอ email ยืนยันการได้รับ CA

ขั้นที่ 3

สำหรับการเชื่อมต่อระบบ

1. กรณีที่ใช้ผ่าน HIS

- รพ. ประสานงานในการเชื่อมต่อ API กับ
ผู้ดูแลระบบ HIS ของท่าน โดยทาง รพ.
จะได้รับข้อมูล API ทางอีเมล

1.1 HosXP


- Ver. 4.0 : เชื่อมต่อได้ทันที
- Ver. 3.0 : เชื่อมต่อในเดือน ธ.ค. 64

1.2 ePhis ของ Abstract

อยู่ระหว่างพัฒนา

2. กรณีเข้าผ่าน Web portal จะได้รับ email เข้าสู่ระบบ

*ต้องทำการส่งข้อมูลให้ MOPH IC
จึงจะสามารถดึงข้อมูลจากระบบ
เพื่อสร้างใบรับรองแพทย์ได้



ขั้นที่ 4

สำหรับออกใบรับรองแพทย์




การใช้งานเบื้องต้นสามารถออก
ใบรับรองแพทย์ได้ 4 ประเภท

1. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19
2. หนังสือรับรองผลตรวจหาเชื้อ
โควิด 19
3. หนังสือรับรองผลตรวจปริมาณ
แอนติบอดีต่อเชื้อโควิด 19
4. หนังสือรับรองแพทย์กรณีนาย
ป่วยจากเชื้อโควิด 19

กรณีเชื่อมต่อ HIS จะสามารถออก
ใบรับรองแพทย์อื่นๆ ได้ในอนาคต



นายอำเภอ / เทศบาล / ท้องถิ่น สํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน



ยุทธการ “**จับเข้าค่าย**”

ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
22 – 28 พฤศจิกายน 2564

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจฉีด วัคซีนป้องกัน COVID 19



สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ควรเตรียมข้อมูล เช่น ชนิดวัคซีน ขั้นตอน ระยะเวลา อาการข้างเคียงและการป้องกันแก้ไข

1

สอบถาม หมายถึง การตั้งคำถามปลายเปิดที่นำไปสู่ประเด็นสนับสนุน
การฉีดวัคซีนและจัดการกับอุปสรรคหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

“สวัสดีค่ะ วันนี้ขอแวะมาเยี่ยมหน่อยนะคะ
มีแมสและเจลแอลกอฮอล์พอไหมค่ะ”

“ที่บอกว่ากลัวติด กลัวลูกลำบาก ลำบากอย่างไร
(อย่างนี้การฉีดวัคซีนป้องกันก็น่าจะช่วยให้)”



“ที่คุณบอกว่าสองจิตสองใจยังไม่อยากฉีด
เพราะอะไรคุณถึงมีความอยากฉีด”

“ที่ยังลังเลนั้นมีความกังวล สงสัยอะไรบ้าง
ไหมเช่นความปลอดภัย?”

2

ชื่นชม หมายถึง การชื่นชมในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความขยัน
ความกตัญญู ห่วงแม่ รักลูก ฯลฯ

“คุณมีความตั้งใจในการดูแลแม่”
“คุณมีความขยันและอดทนมาก”



“คุณนี้เป็นเสาหลักของหลานที่เดียวนะ”

3

การแนะนำ หมายถึง การแนะนำ ซึ่งอาจเป็นแนะนำข้อมูล
(เช่น ส่วนประกอบวัคซีน ความปลอดภัย เปอร์เซ็นต์การลด
ความรุนแรงของโรค)



ข้อเสนอแนะ ให้ดูและสังเกตคนที่ฉีดแล้ว/แนะนำให้ฉีดหมาย/
เลือกวันที่ว่าง/แนะนำให้ไปกับเพื่อน

เทคนิคการสนับสนุนลดแรงต้าน

1. ควรเห็นด้วยบ้างในบางประเด็น
ซึ่งจะลดแรงต้านและพยายามอย่า
ถกเถียง โดยไม่จำเป็น
เช่น “ที่คุณบอกว่าฉีดแล้วอาจหมด
แรงนั้นมันก็เป็นได้แม้ว่าจะบอกรายและ
ส่วนใหญ่ก็หายเองในวันสองวัน

2. เน้นการให้เลือกในสิ่งที่ดี
เช่น เลือกใครไปเป็นเพื่อน/
เลือกวันหรือสถานที่เลือกฉีด
ข้างซ้ายหรือขวา

3. ถ้าไม่จริงจัง ๆ ก็ต้อง
เคารพการตัดสินใจ และ
ขออนุญาตเขียนเขียนหรือ
โทรศัพท์สอบถามเป็นระยะ ๆ





9 วัน 199,999 เข็ม

27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

ขอเชิญประชาชนอายุ 12 ปี ขึ้นไป
รับวัคซีนป้องกัน COVID-19
ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
ในจังหวัดอุบลราชธานี



เข็ม 1

12-18 ปี



18 ปีขึ้นไป



เข็ม 2,3



หรือ





27 พฤศจิกายน 2564

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ขอเชิญประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกัน COVID-19

- | | | | |
|-----------|-------------|---|-------------|
| ✓ สูตร 1 | AstraZeneca | + | AstraZeneca |
| ✓ สูตร 2 | AstraZeneca | + | Pfizer |
| ✓ สูตร 3* | Pfizer | + | Pfizer |

สูตร 3 เฉพาะหญิงตั้งครรภ์
ผู้มีอายุ 12-18 ปี
และ 60 ปีขึ้นไป เท่านั้น

ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี ทุกแห่ง

กรณีกระตุ้นเข็ม 3 ติดต่อเข้ารับบริการตามเงื่อนไขได้ที่หน่วยบริการทุกแห่ง

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๕๒๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าในผิวหนัง การฉีดวัคซีนเข้าหัวใจพร้อมกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม กรณีการให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคซีน Moderna

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าในผิวหนัง (ID) แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจำกัด
๒. ให้ฉีดวัคซีนเข้าหัวใจพร้อมกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้
๓. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม

๓.๑ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ ด้วยวัคซีน Pfizer ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน ขึ้นไป

หลังเข็มที่ ๒

๓.๒ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน ขึ้นไป

หลังเข็มที่ ๒ หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

๔. การให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

๔.๑ กรณีแพ้วัคซีนโควิด 19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

- ๔.๒ กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

๔.๒.๑ ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ๑ - ๒ เข็ม และวัคซีน AstraZeneca ๑ เข็ม ให้รับวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาดำเนินการที่รับวัคซีนได้ ๘ สัปดาห์ หรือได้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาดำเนินการที่รับวัคซีนได้ ๔ สัปดาห์

๔.๒.๒ ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ๑ - ๒ เข็ม และวัคซีน Pfizer ๑ เข็ม ให้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาดำเนินการที่รับวัคซีนได้ ๔ สัปดาห์

๔.๒.๓ ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ๑ เข็ม และวัคซีน Pfizer ๑ เข็ม สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

๕.การฉีด...

- ๒ -

๕. การฉีดวัคซีน Moderna

- ๕.๑ การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

๕.๑.๑ ให้ฉีดวัคซีน Moderna ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์ โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna

- ๕.๒ การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

๕.๒.๑ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๒ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๓ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinopharm และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๔ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

- ๕.๓ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

๕.๓.๑ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

๕.๓.๒ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

๕.๓.๓ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน หลังเข็มที่ ๒ เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน ๖ เดือน หลังเข็มที่ ๒ โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๖ - ๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๖ - ๕

กรณีอายุน้อยกว่า 18 ปี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ชนิดวัคซีน	เข็มที่	เงื่อนไข
	1	ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน (ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย)
	2	รับวัคซีน Pfizer มาแล้ว 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

กรณีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

ชนิดวัคซีน	เข็มที่	เงื่อนไข
	1	ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน
	2	รับวัคซีน Sinovac มาแล้ว 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือรับ AstraZeneca มาแล้ว 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่ไม่ได้รับวัคซีน สูตรไขว้ หรือเคยป่วยด้วยโควิดมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และยังไม่เคยได้รับวัคซีน
	3	รับวัคซีน Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ วัคซีน Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
	1	ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน และจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่รับวัคซีน Pfizer
	2	รับวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือ เคยรับ Pfizer เข็ม 1 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ หรือเคยป่วยด้วยโควิดมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และยังไม่เคยได้รับวัคซีน
	3	รับ AstraZeneca มาแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือรับ Sinovac + AstraZeneca โดยรับเข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

สรุปประสิทธิภาพ

วัคซีนเข็ม3 **Booster Dose**

today

เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	ระยะห่าง	ประสิทธิภาพ
 sinovac	 sinovac	 AstraZeneca	3 เดือน หลังครบ 2 เข็ม	ภูมิคุ้มกันสูง รับมือสายพันธุ์เดลตาได้
 sinovac	 sinovac	 Pfizer	3 เดือน หลังครบ 2 เข็ม	ภูมิคุ้มกันสูง รับมือสายพันธุ์เดลตาได้
 sinovac	 sinovac	 moderna	3 เดือน หลังครบ 2 เข็ม	ภูมิคุ้มกันสูง รับมือสายพันธุ์เดลตาได้
 sinovac	 sinovac	 SINOPHARM ไม่แนะนำ	-	ภูมิคุ้มกันไม่สูง กันสายพันธุ์เดลตาไม่ได้
 SINOPHARM	 SINOPHARM	ควรกระตุ้นด้วย mRNA หรือ viral vector	3 เดือน หลังครบ 2 เข็ม	ฉีด 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันไม่สูง รับมือสายพันธุ์เดลตาไม่ได้
 AstraZeneca	 AstraZeneca	ควรกระตุ้นด้วย mRNA	6 เดือน หลังครบ 2 เข็ม	ฉีด 2 เข็ม ภูมิคุ้มกัน อยู่ได้ 5 เดือน (ข้อมูล ยุโรป อังกฤษ)
 sinovac	 AstraZeneca	อยู่ระหว่างศึกษา การฉีดกระตุ้น	-	ภูมิคุ้มกันใกล้เคียงการฉีด AstraZeneca 2 เข็ม
 AstraZeneca	 moderna หรือ  Pfizer	ยังไม่มีการศึกษา การฉีดกระตุ้น	-	ฉีด 2 เข็ม ภูมิคุ้มกัน อยู่ในระดับสูงมาก
 moderna	 moderna	ยังไม่มีคำแนะนำ ให้ฉีดกระตุ้น	-	ฉีด 2 เข็ม พบว่าหลัง 6 เดือน ยังมีภูมิคุ้มกันในระดับสูง
 Pfizer	 Pfizer	การกระตุ้นขึ้นอยู่กับว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่	6 เดือน หลังครบ 2 เข็ม	ฉีด 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันสูง อยู่ได้ 4-6 เดือน (ข้อมูล อิสราเอล ยุโรป สหรัฐฯ)



แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

สูตรที่มีการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ

การฉีดวัคซีน สูตรไขว้	 sinovac*  ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์	 AstraZeneca 
การฉีดวัคซีน สูตรไขว้	 AstraZeneca  ระยะห่างระหว่างเข็ม 4-12 สัปดาห์	 Pfizer 
การฉีดวัคซีน ชนิดเดียวกัน	 AstraZeneca  ระยะห่างระหว่างเข็ม 8-12 สัปดาห์	 AstraZeneca 
การฉีดวัคซีนชนิด เดียวกัน	 Pfizer  ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์	 Pfizer 

สำหรับสูตรการฉีดวัคซีนไขว้ Sinovac - Pfizer ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

4.1.2 แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย



โดยอ้างอิงคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

สูตรเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ที่มีการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ

การฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้น



sinovac*



sinovac*



AstraZeneca

ระยะห่างประมาณ 4 เดือน

การฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้น



SINOPHARM



SINOPHARM



AstraZeneca

ระยะห่างประมาณ 4 เดือน

การฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้น



AstraZeneca



AstraZeneca



Pfizer

ระยะห่างประมาณ 6 เดือน

หมายเหตุ วัคซีน Moderna สามารถฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตรข้างต้น

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หลังฉีดวัคซีนสูตรอื่นๆ ครบตามเกณฑ์อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ให้รอการประกาศฉีดในระยะถัดไป

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

