



COVID-19
Vaccine

injection only

Vaccine Supply

COVID-19
Vaccine

injection only

type	ขวด	Dose
SinoVac	729,120	729,120
AstraZeneca	84,661	846,610
Pfizer	110,357	662,142
Sinopharm	31,600	31,600
Moderna	3,992	59,880
รวม		2,329,352


ผลงานการให้บริการ

เข็ม 1	1,123,620 เข็ม
เข็ม 2	963,360 เข็ม
เข็ม 3	100,169 เข็ม
เข็ม 4	9,638 เข็ม
รวม	2,196,787 เข็ม

ผลงานรายวัน 5 ม.ค.65


ผลงานฉีดวัคซีนรายวัน วันที่ 5 มกราคม 2565					
hcode	ชื่อหน่วยให้บริการ	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	รวม
10669	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	309	548	349	1,206
10944	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	23	157	133	313
10945	รพ.โขงเจียม	43	176	41	260
10946	รพ.เขื่องใน	106	472	145	723
10947	โรงพยาบาลเขมราฐ	57	245	47	349
10948	โรงพยาบาลนาจะหลวย	86	327	62	475
10949	โรงพยาบาลน่ายิน	-	-	-	-
10950	โรงพยาบาลบุณฑริก	78	243	55	376
10951	โรงพยาบาลตระการพืชผล	133	320	7	460
10952	โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น	-	79	-	79
10953	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ	90	204	51	345
10954	โรงพยาบาลวารินชำราบ	188	661	563	1,412
10956	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร	81	253	18	352
10957	โรงพยาบาลตาลสุม	6	24	15	45
10958	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	30	20	6	56
10959	โรงพยาบาลสำโรง	-	90	38	128
10960	โรงพยาบาลดอนมดแดง	27	90	44	161
10961	โรงพยาบาลสิรินธร	14	59	4	77
10962	โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	35	198	17	250
11443	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	123	386	197	706
11495	โรงพยาบาลกองมิน 21	16	2	1	19
11496	โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (สโม)	-	1	227	228
11918	รพ.เอกชนรัมย์เกล้า	-	-	-	-
11919	โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี	79	160	223	462
11920	โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี	-	-	-	-
12269	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	-	1	1	2
12270	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่	-	-	-	-
14201	โรงพยาบาลมะเร็งบูลราชธานี	-	-	-	-
15078	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	-	295	38	333
21984	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ	145	99	60	304
24032	รพ.นาตาล	67	249	97	413
24821	รพ.นาเยีย	-	-	-	-
27967	โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์	49	227	68	344
27968	โรงพยาบาลน้ำขุ่น	-	-	-	-
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	-	-	-	-
40864	โรงพยาบาลพนัชนิ์ อุบลราชธานี	3	8	2	13
41674	รพ.ชีวามิตรา	-	-	-	-
รวม		1,788	5,594	2,509	9,891
ร้อยละ		18.08	56.56	25.37	295

อัตราการฉีดวัคซีนประชาชนทะเบียนราษฎร์ รายอำเภอ




อัตราการฉีดวัคซีนประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ รายอำเภอ

Workload



อัตราการฉีดวัคซีนประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ รายอำเภอ


Coverage



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน โดยใช้การตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน

อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ที่อาศัยอยู่จริง รายอำเภอ

Coverage



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน โดยใช้การตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน

Coverage

code	โรงพยาบาล	เป้าหมาย typearea1,3	ฉีดเข็ม 1 แล้ว	ร้อยละ
10669	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	58,581	45,265	77.27
10944	รพ.ศรีเมืองใหม่	47,852	40,178	83.96
10945	รพ.โขงเจียม	24,493	19,228	78.50
10946	รพ.เขื่องใน	70,792	58,939	83.26
10947	รพ.เขมราฐ	60,015	47,304	78.82
10948	รพ.นาจะหลวย	39,432	32,138	81.50
10949	รพ.น่ายิน	45,039	35,357	78.50
10950	รพ.บุณฑริก	59,257	49,434	83.42
10951	รพ.ตระการพืชผล	71,775	59,215	82.50
10952	รพ.กุดข้าวปุ้น	20,376	16,726	82.09
10953	รพ.ม่วงสามสิบ	47,465	43,379	91.39
10954	รพ.วารินชำราบ	101,037	85,227	84.35
10956	รพ.พิบูลมังสาหาร	84,509	68,749	81.35
10957	รพ.ตาลชุม	17,981	14,738	81.96
10958	รพ.โพธิ์ไทร	29,836	24,441	81.92
10959	รพ.ลำโรง	37,955	33,147	87.33
10960	รพ.ดอนมดแดง	16,230	13,919	85.76
10961	รพ.สิรินธร	37,333	28,758	77.03
10962	รพ.ทุ่งศรีอุดม	17,143	14,832	86.52
11443	รพ.ร.เดชอุดม	115,098	96,584	83.91
11495	รพ.กองбин 21			
11496	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	7,164	5,501	76.79
11918	รพ.เอกชนร่มเกล้า	4,871	3,180	65.28
11919	รพ.อุบลรักษธานี			
11920	รพ.ราชเวชอุบลราชธานี			
12269	รพ.พระศรีมหาโพธิ์			
12270	รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อ	-	-	
14201	รพ.มะเร็งบูลราชธานี			
15078	รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราช	6	2	
21984	รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิรา	89,408	75,843	84.83
24032	รพ.นาตาล	23,490	18,922	80.55
24821	รพ.นาเยีย	18,860	16,113	85.43
27967	รพ.สว่างวีระวงศ์	19,329	16,704	86.42
27968	รพ.นาขุ่น	18,750	15,950	85.07
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	18,817	15,654	83.19
40864	รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี			
41674	รพ.ชีวามิตรรา			
รวม		1,202,894	995,427	82.75

Workload

code	โรงพยาบาล	เป้าหมาย typearea1,3	ฉีดเข็ม 1 แล้ว	ร้อยละ
10669	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	58,581	120,636	205.93
10944	รพ.ศรีเมืองใหม่	47,852	40,813	85.29
10945	รพ.โขงเจียม	24,493	20,181	82.39
10946	รพ.เขื่องใน	70,792	54,739	77.32
10947	รพ.เขมราฐ	60,015	43,407	72.33
10948	รพ.นาจะหลวย	39,432	31,072	78.80
10949	รพ.น่ายิน	45,039	35,698	79.26
10950	รพ.บุณฑริก	59,257	49,492	83.52
10951	รพ.ตระการพืชผล	71,775	61,321	85.44
10952	รพ.กุดข้าวปุ้น	20,376	20,236	99.31
10953	รพ.ม่วงสามสิบ	47,465	47,111	99.25
10954	รพ.วารินชำราบ	101,037	74,053	73.29
10956	รพ.พิบูลมังสาหาร	84,509	69,243	81.94
10957	รพ.ตาลชุม	17,981	16,237	90.30
10958	รพ.โพธิ์ไทร	29,836	24,088	80.73
10959	รพ.ลำโรง	37,955	31,361	82.63
10960	รพ.ดอนมดแดง	16,230	13,632	83.99
10961	รพ.สิรินธร	37,333	28,532	76.43
10962	รพ.ทุ่งศรีอุดม	17,143	15,875	92.60
11443	รพ.ร.เดชอุดม	115,098	94,936	82.48
11495	รพ.กองбин 21	-	5,228	
11496	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	7,164	14,994	209.30
11918	รพ.เอกชนร่มเกล้า	4,871	1,100	22.58
11919	รพ.อุบลรักษธานี	-	12,090	
11920	รพ.ราชเวชอุบลราชธานี	-	3,943	
12269	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	-	3,124	
12270	รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อ	-	2,557	
14201	รพ.มะเร็งบูลราชธานี	-	3,248	
15078	รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราช	6	14,708	
21984	รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิรา	89,408	60,659	67.85
24032	รพ.นาตาล	23,490	18,182	77.40
24821	รพ.นาเยีย	18,860	15,225	80.73
27967	รพ.สว่างวีระวงศ์	19,329	16,545	85.60
27968	รพ.นาขุ่น	18,750	17,651	94.14
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	18,817	14,783	78.56
40864	รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี	-	26,910	
41674	รพ.ชีวามิตรรา	-	10	
รวม		1,202,894	1,123,620	93.41

Coverage 608

Hcode	โรงพยาบาล	เป้า 608 type1+3	result 608	ร้อยละ 608
10669	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	17,678	12,896	72.95
10944	รพ.ศรีเมืองใหม่	13,559	11,456	84.49
10945	รพ.โขงเจียม	6,278	4,558	72.60
10946	รพ.เขื่องใน	23,223	18,721	80.61
10947	รพ.เขมราฐ	14,767	11,044	74.79
10948	รพ.นาจะหลวย	9,637	7,444	77.24
10949	รพ.น่ายิน	11,440	8,614	75.30
10950	รพ.บุญเทิด	15,949	12,851	80.58
10951	รพ.ตระการพืชผล	24,133	19,352	80.19
10952	รพ.กุดข้าวปุ้น	6,599	5,100	77.28
10953	รพ.ม่วงสามสิบ	17,180	15,381	89.53
10954	รพ.วารินชำราบ	29,495	23,574	79.93
10956	รพ.พิบูลมังสาหาร	24,510	18,869	76.98
10957	รพ.ตาลชุม	5,667	4,442	78.38
10958	รพ.โพธิ์ไทร	9,590	7,181	74.88
10959	รพ.สำโรง	10,983	9,471	86.23
10960	รพ.ดอนมดแดง	5,202	4,265	81.99
10961	รพ.สิรินธร	9,388	6,920	73.71
10962	รพ.ทุ่งศรีอุดม	4,864	4,271	87.81
11443	รพ.สมเด็จพระยุพราชเดช	28,978	24,537	84.67
11495	รพ.กอนนบดิน 21		-	
11496	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	1,645	1,120	68.09
11918	รพ.เอกชนร่มเกล้า	629	288	45.79
11919	รพ.อุบลราชธานี		-	
11920	รพ.ราชเวชอุบลราชธานี		-	
12269	รพ.พระศรีมหาโพธิ์		-	
12270	รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์	2	-	-
14201	รพ.มะเร็ตอุบลราชธานี		-	
15078	รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราช	1	1	100.00
21984	รพ. ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัย	26,588	21,428	80.59
24032	รพ.นาตาล	7,040	5,501	78.14
24821	รพ.นาเยีย	5,002	4,207	84.11
27967	รพ.สว่างวีระวงศ์	5,671	4,669	82.33
27968	รพ.น้ำขุ่น	5,398	4,469	82.79
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	5,319	4,337	81.54
40864	รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี		-	
41674	รพ.ชีวามิตร		-	
	รวม	346,415	276,967	79.95

กลยุทธ์เพื่อยกระดับความครอบคลุม
และเสริมศักยภาพการให้บริการวัคซีนโควิด 19

กรมควบคุมโรค

วันที่ 4 มกราคม 2565

กลยุทธ์เพื่อยกระดับความครอบคลุมและเสริมศักยภาพการให้บริการวัคซีนโควิด 19

กลยุทธ์ที่ 1 กระจายจุดฉีดให้ทั่วถึงทุกจังหวัด

- มุ่งหวังให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนได้โดยสะดวก ลดการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย
- กำหนดจุดฉีดหลัก ระบบนัดหมาย/ลงทะเบียน/Walk-in โดยกำหนดจำนวนหน่วยฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับวัคซีน
- กำหนดจุดฉีดที่ระดับ รพ.สต./คลินิกเวชกรรม
- จังหวัด/เขตสุขภาพ จัดแผนรณรงค์ฉีด รายสัปดาห์/เดือน โดยปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพื้นที่
- จัดทีม CCRT สำหรับกลุ่มเข้าถึงยาก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

กลยุทธ์ที่ 3 ประชาชนเข้ารับบริการได้ทันที

- Any where อยู่จังหวัดไหนก็ฉีดได้ ไม่ต้องฉีดจุดเดิม
- Any regimen ใช้ได้ทุกสูตรที่ผ่านการรับรองทางวิชาการ ตาม Supply vaccine
- Any target ทุกคนต้องมีสิทธิ์ ทั้ง ไทย ไม่ใช่ไทย
- Any time สามารถเข้าฉีดแบบ Walk-in และสามารถฉีดในวันหยุดได้ โดยแต่ละจังหวัดกำหนดให้ฉีดในวันหยุดได้ สัปดาห์ละ 1 วัน
- อำนวยความสะดวกประชาชน เพิ่มจุดฉีดที่ขนส่งสาธารณะ หรือตามสถานประกอบการ ลงทะเบียนนัดหมายที่ร้านสะดวกซื้อ
- สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิดที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องรอฉีด mRNA

กลยุทธ์ที่ 2 มีวัคซีนพร้อมในพื้นที่

- เสนอแผนและระบบบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine inventory) ระดับชาติ
- คลังวัคซีน (Stockpile) ประจำเขตสุขภาพ/จังหวัด
- Logistic ระดับจังหวัด ติดตามโดยเขตสุขภาพ และส่วนกลาง
- แผนการจัดซื้อจัดหาวัคซีน เร่งรัด ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
- รพ สต ทุกแห่ง มีการสำรองวัคซีนเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดได้ทันทั่วทั้ง (วัคซีน AstraZeneca และ Sinovac)
- พบอัตราการสูญเสียวัคซีน (Wastage rate) ประมาณร้อยละ 25-40 สำหรับวัคซีน Multiple doses เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง (608 และกลุ่มเด็ก) ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เข้ารับวัคซีน

- วิเคราะห์สาเหตุที่กลุ่มเป้าหมาย 608 และกลุ่มเด็กปฏิเสธการรับวัคซีน
- เน้นการบริการถึงที่ และแบบ Walk-in

กลยุทธ์ที่ 5 ค้นหากลุ่มประชากรที่มีเชื้อสายชาติไทยในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมต่ำหรือเข้าถึงยาก ให้เข้ารับวัคซีน

- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มเป้าหมายหลักให้จัดทำรายชื่อนัดหมาย และติดต่อสถานที่ฉีด
- ติดตามกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนเพื่อนำเข้ารับบริการ เช่น กลุ่มคนลี้ภัย ขนเผ่าตามชายแดน แรงงานภาคประมง ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยฉีดวัคซีนได้
- ประสาน มท. หรือการประชาสัมพันธ์หรือใช้กลยุทธ์ผ่าน application เป้าตั้ง

ข้อสั่งการจาก EOC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564



1. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- 1.1 เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2 เข็ม และถึงกำหนดการรับวัคซีนเข็มที่ 3 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจ และอำนวยความสะดวกในการเข้ารับวัคซีน รวมทั้งการจัดบริการเชิงรุก
- 1.2 ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- 1.3 กำกับหน่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ประสงค์จะรับวัคซีน ทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และผู้ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนมาจากนอกพื้นที่
- 1.4 จัดทำแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมกราคม 2565 ตามนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข
- 1.5 เตรียมความพร้อมการให้วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้รูปแบบการให้วัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา (School based vaccination) ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้ต้องเป็น Pediatric formulation ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น

2. ให้เขตสุขภาพ

- 2.1 บริหารจัดการเกลี่ยวัคซีนภายในเขตสุขภาพ เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

แผนจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ในปี 2565

หลักการสำคัญ ดังนี้

- เพื่อให้ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและครอบคลุม
- เพื่อเตรียมการรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์
- เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ
- เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ตามแผนที่กำหนด

เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2565 ดังนี้

- ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอและครอบคลุม อย่างน้อยร้อยละ 80
- ผู้ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- กลุ่มเป้าหมายอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

นโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2565

ผ่านมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 15 ธันวาคม 2564

หลักการจัดสรรวัคซีนปี 2565 ให้พิจารณาจาก

- นโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขรายเดือน
- จำนวนวัคซีนที่ขอรับการสนับสนุน
- จำนวนวัคซีนที่บริษัทผู้ผลิตส่งมอบ

ข้อมูลจำนวนวัคซีน AstraZeneca ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

- ข้อมูลจากกองตรวจราชการ มีวัคซีนในพื้นที่ **ประมาณ 6 ล้านโดส**
- รอรับมอบเพิ่มเติม **ประมาณ 12.6 ล้านโดส** ภายในเดือนธันวาคม 2564
- ลงนามสัญญาการจัดซื้อ **60 ล้านโดส** ในปี 2565

นโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2565

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน

- ให้ใช้สูตร AstraZeneca-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer และ Sinovac-AstraZeneca เป็นหลัก สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ให้ใช้สูตร Pfizer-Pfizer สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปีเป็นหลัก

2. ผู้ที่มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดการที่ได้นัดหมายไว้

3. ผู้ที่ต้องการรับเข็มกระตุ้น

- ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac-AstraZeneca ครบ ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นหลัก
- ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นหลัก

4. ผู้ที่เคยติดเชื้อและต้องการรับเข็มกระตุ้น

- ให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca กระตุ้น ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ หรือ ครบตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ

ทั้งนี้สามารถใช้สูตรอื่นที่ผ่านการรับรองทางวิชาการได้ ภายใต้จำนวนวัคซีนที่มีในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564



มติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ปรับจากมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

วัคซีนเข็มที่ 1-2	วัคซีนเข็มที่ 3	ระยะห่างระหว่าง เข็มที่ 2 และ 3
การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน		
Sinovac – Sinovac หรือ Sinopharm – Sinopharm	AstraZeneca / Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
AstraZeneca – AstraZeneca	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
Pfizer – Pfizer หรือ Moderna – Moderna	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
การฉีดวัคซีนสูตรไขว้		
Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca	AstraZeneca / Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
Sinovac/Sinopharm – Pfizer	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
AstraZeneca – Pfizer	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- หมายเหตุ
- ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจำนวนวัคซีนในพื้นที่
 - คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาด หรือ จำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลา หรือ ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564



มติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
หลักการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศ

คำแนะนำหลักการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศ โดยเป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ใน
ประเทศไทย เช่น Spuknit V, Spuknit Light, J&J, Covaxin, Abdala และอื่นๆ

ประวัติการได้รับวัคซีน จากต่างประเทศ	หลักการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม
กรณีได้รับวัคซีน <u>ไม่ครบ</u> ตามเกณฑ์	ขอให้เทียบเคียงกับคำแนะนำการฉีดวัคซีนของประเทศไทย ตามชนิด (Platform) ของวัคซีนที่เคยได้รับ
กรณีได้รับวัคซีน <u>ครบ</u> ตามเกณฑ์	พิจารณาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเทียบเคียงชนิด (Platform) ของวัคซีน ตามคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของประเทศไทย

- หมายเหตุ
1. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจำนวนวัคซีนในพื้นที่
 2. คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาด หรือ จำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลา หรือ ข้อมูลการศึกษาวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11* ปี ดังนี้

1. ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ที่กำหนด
2. การตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีน ให้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ปกครอง
3. รูปแบบการให้วัคซีน กำหนดให้โรงเรียนเป็นจุดฉีดเป็นหลัก ร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล โดยให้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน
4. ควรมีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบฉีดวัคซีนจนเกินไป

หมายเหตุ * ครอบคลุมถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4

ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

ประวัติการได้รับวัคซีน		ชนิดวัคซีนสำหรับเข็มที่ 4	ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 3 และ 4
วัคซีนเข็มที่ 1-2	วัคซีนเข็มที่ 3		
Sinovac – Sinovac	AstraZeneca	AstraZeneca / Pfizer* / Moderna	3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 3
Sinovac – Sinovac	Pfizer	Pfizer* / Moderna	3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 3
หมายเหตุ * การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประสงค์จะฉีดครั้งโดสหรือฉีดเข้าในผิวหนังให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน ** การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนสูตรอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน			

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำให้ฉีดวัคซีน กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร โดยกำหนดให้วัคซีนเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนชนิด mRNA (Pfizer/Moderna) โดยมีระยะห่างตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ข้อเสนอเพื่อทราบ




รับทราบ

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง และการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มอบหมายให้

- กรมควบคุมโรค แจ้งคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้บริการวัคซีนภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 - วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง
 - วัคซีนเข็มที่ 3 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร
 - เตรียมความพร้อมการให้วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้รูปแบบการให้วัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา (School based vaccination) ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้ต้องเป็น Pediatric formulation ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น

คนอุบลฯ อยากได้สูตรไหน เราจัดให้.....

เข็ม ①	เข็ม ②	เข็ม ③	ระยะห่าง
		  	4 สัปดาห์ หลังเข็ม 2
		  	4 สัปดาห์ หลังเข็ม 2
		 	3-6 เดือน หลังเข็ม 2
		 	6 เดือน หลังเข็ม 2
		 	6 เดือน หลังเข็ม 2
 		  	3-6 เดือน หลังเข็ม 2
 		 	3-6 เดือน หลังเข็ม 2
	 	 	6 เดือน หลังเข็ม 2
 ป่วย COVID	  	  	เข็ม 2 = 3 เดือน หลังป่วย COVID

Last Update 13/12/2564



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อคนไทยปลอดภัย
ประเทศไทยปลอดภัย

ข้อสั่งการ 14/12/64

Mn ที่ได้รับจากสภากาชาดไทย

- ตามรายชื่อที่ได้ (3,150-376 = 2,773)
- ส่วนเพิ่ม 3,527 ราย กระจายให้ อสม. + walk in

Mn เหลือในคลัง 2,880 dose

- ใช้เป็นเข็ม 4 บุคลากร (ห่างเข็ม 3 มากกว่า 4 ด.)

AZ => เปิดบริการกระตุ้นเข็ม 4 (ห่างเข็ม 3 มากกว่า 3 ด.)

SV เหลือ 1,161 dose ใช้ฉีดนักโทษใหม่ (ให้เอาไปให้เรือนจำ)



ขั้นตอนการดำเนินการ MOPH Certificate



ขั้นที่ 1

สำหรับผู้ประสานงานของโรงพยาบาล



โรงพยาบาล Scan QR code เพื่อลงทะเบียน



ข้อควรระวัง : กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด
(จะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง)



ได้ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาล

ขั้นที่ 2

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผู้มีอำนาจลงนาม



แพทย์ Scan QR code
เพื่อลงทะเบียน OneID
<https://one.th/register>
(ต้องจำ User/Password)



แพทย์ Scan QR code
เพื่อสร้างลายเซ็นดิจิทัล
สำหรับผู้ลงนาม และเจ้าหน้าที่



รอ email ยืนยันการได้รับ CA

ขั้นที่ 3

สำหรับการเชื่อมต่อระบบ

1. กรณีที่ใช้ผ่าน HIS

- รพ. ประสานงานในการเชื่อมต่อ API กับ
ผู้ดูแลระบบ HIS ของท่าน โดยทาง รพ.
จะได้รับข้อมูล API ทางอีเมล

1.1 HosXP


- Ver. 4.0 : เชื่อมต่อได้ทันที
- Ver. 3.0 : เชื่อมต่อในเดือน ธ.ค. 64

1.2 ePhis ของ Abstract

อยู่ระหว่างพัฒนา

2. กรณีเข้าผ่าน Web portal จะได้รับ email เข้าสู่ระบบ

*ต้องทำการส่งข้อมูลให้ MOPH IC
จึงจะสามารถดึงข้อมูลจากระบบ
เพื่อสร้างใบรับรองแพทย์ได้



ขั้นที่ 4

สำหรับออกใบรับรองแพทย์




การใช้งานเบื้องต้นสามารถออก
ใบรับรองแพทย์ได้ 4 ประเภท

1. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19
2. หนังสือรับรองผลตรวจหาเชื้อ
โควิด 19
3. หนังสือรับรองผลตรวจปริมาณ
แอนติบอดีต่อเชื้อโควิด 19
4. หนังสือรับรองแพทย์กรณีนาย
ป่วยจากเชื้อโควิด 19

กรณีเชื่อมต่อ HIS จะสามารถออก
ใบรับรองแพทย์อื่นๆ ได้ในอนาคต



นายอำเภอ / เทศบาล / ท้องถิ่น สํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน



ยุทธการ “จับเข้าค่าย”

ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
22 – 28 พฤศจิกายน 2564

