



COVID-19
Vaccine

injection only

Vaccine Supply

COVID-19
Vaccine
injection only

ผลงานการให้บริการ


เข็ม 1	1,277,099 เข็ม
เข็ม 2	1,188,238 เข็ม
เข็ม 3	450,510 เข็ม
เข็ม 4	45,209 เข็ม
รวมทุกเข็ม	2,962,686 เข็ม

ผลงานการฉีดวัคซีน รวม

ผลงานฉีดวัคซีนรวม วันที่ 3 กรกฎาคม 2565						
hcode	ชื่อหน่วยให้บริการ	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 4	รวม
10669	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	135,008	129,901	60,526	15,862	341,297
10944	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	46,172	42,800	17,248	1,261	107,481
10945	รพ.โขงเจียม	23,493	21,668	6,328	308	51,797
10946	รพ.เขื่องใน	63,610	59,671	27,771	1,424	152,476
10947	โรงพยาบาลเขมราฐ	49,065	44,620	10,243	794	104,722
10948	โรงพยาบาลนาจะหลวย	35,336	32,116	8,295	356	76,103
10949	โรงพยาบาลน่ายิน	42,301	38,567	9,657	497	91,022
10950	โรงพยาบาลบุณฑริก	56,716	50,334	15,260	812	123,122
10951	โรงพยาบาลตระการพืชผล	71,369	66,018	20,212	936	158,535
10952	โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น	23,277	21,638	6,533	226	51,674
10953	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ	53,873	51,400	30,667	1,111	137,051
10954	โรงพยาบาลวารินชำราบ	86,162	80,873	43,056	3,313	213,404
10956	โรงพยาบาลพินุลมังสาหาร	79,781	74,466	21,667	1,091	177,005
10957	โรงพยาบาลตาลสุม	18,398	16,784	6,526	310	42,018
10958	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	27,385	25,029	8,687	241	61,342
10959	โรงพยาบาลสำโรง	35,658	33,266	11,998	523	81,445
10960	โรงพยาบาลดอนมดแดง	15,881	14,917	7,854	252	38,904
10961	โรงพยาบาลสิรินธร	33,265	30,848	7,534	490	72,137
10962	โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	17,845	16,012	5,300	267	39,424
11443	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	107,679	97,599	30,682	1,654	237,614
11495	โรงพยาบาลกอนนบดิน 21	5,254	5,067	2,053	404	12,778
11496	โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (สโ)	15,094	15,453	5,928	1,240	37,715
11918	รพ.เอกชนร่มเกล้า	1,134	783	500	239	2,656
11919	โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี	12,831	13,276	9,898	3,483	39,488
11920	โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี	3,975	4,051	1,749	779	10,554
12269	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	3,319	3,000	1,028	483	7,830
12270	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่	2,556	2,085	197	89	4,927
14201	โรงพยาบาลมะเร็งบูลราชธานี	3,245	3,191	640	304	7,380
15078	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	15,004	14,609	3,314	361	33,288
21984	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ	69,612	63,331	29,724	1,806	164,473
24032	รพ.นาดาล	20,668	18,850	6,625	263	46,406
24821	รพ.นาเยีย	17,383	15,663	6,557	365	39,968
27967	โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์	19,049	17,601	6,064	268	42,982
27968	โรงพยาบาลน้ำขุ่น	19,927	18,149	5,239	207	43,522
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	16,921	15,615	7,212	348	40,096
40864	โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี	28,843	28,977	7,722	2,841	68,383
41674	รพ.ชีวมิตรา	10	10	16	1	37
	รวม	1,277,099	1,188,238	450,510	45,209	2,961,056
	ร้อยละ	43.13	40.13	15.21	1.53	

อัตราการฉีดวัคซีนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ อายุ 12 ปี ขึ้นไป


Coverage
เข็ม 1



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน โดยใช้การตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน

อัตราการฉีดวัคซีนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ อายุ 12 ปี ขึ้นไป

Coverage
เพิ่ม 2




ผลงาน คัดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน เทียบกับ ปชก.เป้าหมายทั้งหมด

อัตราการฉีดวัคซีนประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ อายุ 12 ปี ขึ้นไป

Coverage
เข็ม3

70




ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน เทียบกับ ปชก.เป้าหมายทั้งหมด

อำเภอ	เป้าหมาย คนอยู่จริง	จัดเข้ม 1 แล้ว	ร้อยละ 1	จัดเข้ม 2 แล้ว	ร้อยละ 2	จัดเข้ม 3 แล้ว	ร้อยละ 3
กุดข้าวปุ้น	20,832	18,045	86.62	17,258	82.84	6,501	31.21
เขมราฐ	59,385	48,837	82.24	46,060	77.56	13,794	23.23
เขื่องใน	71,547	62,988	88.04	60,694	84.83	30,318	42.37
โขงเจียม	25,010	20,989	83.92	19,977	79.88	6,751	26.99
ดอนมดแดง	16,411	14,780	90.06	14,298	87.12	7,613	46.39
เดชอุดม	116,860	101,070	86.49	95,753	81.94	33,605	28.76
ตระการพืชผล	72,533	63,484	87.52	61,194	84.37	20,153	27.78
ตาลสม	18,200	15,626	85.86	14,763	81.12	6,154	33.81
ทุ่งศรีอุดม	17,338	15,325	88.39	14,302	82.49	5,450	31.43
นาจะหลวย	40,248	34,270	85.15	32,299	80.25	10,580	26.29
นาตาล	21,963	18,829	85.73	17,717	80.67	6,795	30.94
นาเยีย	19,173	17,281	90.13	16,359	85.32	6,921	36.10
น้ำขุ่น	19,022	16,868	88.68	15,789	83.00	5,113	26.88
น้ำยืน	45,694	39,201	85.79	37,063	81.11	11,097	24.29
บุณฑริก	59,345	51,571	86.90	47,689	80.36	16,482	27.77
พิบูลมังสาหาร	85,159	72,663	85.33	69,725	81.88	24,235	28.46
โพธิ์ไทร	29,415	25,654	87.21	24,338	82.74	9,433	32.07
ม่วงสามสิบ	48,178	45,309	94.04	44,278	91.91	28,010	58.14
เมือง	154,578	132,912	85.98	129,389	83.70	70,839	45.83
วารินชำราบ	108,551	95,858	88.31	91,893	84.65	39,166	36.08
ศรีเมืองใหม่	48,411	42,194	87.16	40,557	83.78	18,347	37.90
สว่างวีระวงศ์	19,675	17,781	90.37	16,903	85.91	5,798	29.47
สำโรง	37,644	34,210	90.88	32,870	87.32	13,092	34.78
สิรินธร	37,358	31,937	85.49	30,201	80.84	9,255	24.77
เหล่าเสือโก้ก	19,022	16,565	87.08	15,812	83.12	7,502	39.44
Grand Total	1,211,552	1,054,247	87.02	1,007,181	83.13	413,004	34.09

อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 507 ที่อาศัยอยู่จริง รายอำเภอ


เข็ม 1



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน เทียบกับ ปชก.เป้าหมายทั้งหมด

อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 507 ที่อาศัยอยู่จริง รายอำเภอ


เข็ม 2



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน เทียบกับ ปชก.เป้าหมายทั้งหมด

อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 507 ที่อาศัยอยู่จริง รายอำเภอ

Coverage
เข็ม3




ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน เทียบกับ ปชก.เป้าหมายทั้งหมด


อำเภอ	เป้า 50/ type1+3	จัดเข้ม 1 แล้ว	ร้อยละ1	จัดเข้ม 2 แล้ว	ร้อยละ 2	จัดเข้ม 3 แล้ว	ร้อยละ 3
กุดข้าวปุ้น	11,796	9,108	77.21	8,679	73.58	3,753	31.82
เขมราฐ	27,334	20,169	73.79	18,792	68.75	5,268	19.27
เขื่องใน	43,067	35,032	81.34	33,757	78.38	18,297	42.48
โขงเจียม	11,936	8,927	74.79	8,369	70.12	3,033	25.41
ดอนมดแดง	9,537	8,176	85.73	7,888	82.71	4,732	49.62
เดชอุดม	58,207	47,026	80.79	44,459	76.38	16,304	28.01
ตระการพืชผล	44,488	35,599	80.02	34,103	76.66	12,680	28.50
ตาลชุม	10,863	8,252	75.96	7,724	71.10	3,646	33.56
ทุ่งศรีอุดม	8,593	7,257	84.45	6,766	78.74	2,925	34.04
นาจะหลวย	16,796	13,579	80.85	12,730	75.79	4,556	27.13
นาตาล	12,793	9,985	78.05	9,317	72.83	4,155	32.48
นาเยีย	8,941	7,618	85.20	7,177	80.27	3,359	37.57
น้ำขุ่น	9,746	8,114	83.25	7,511	77.07	2,799	28.72
น้ำยืน	21,374	17,017	79.62	16,056	75.12	5,228	24.46
บุณฑริก	28,508	22,831	80.09	20,904	73.33	7,842	27.51
พิบูลมังสาหาร	45,151	35,032	77.59	33,525	74.25	12,228	27.08
โพธิ์ไทร	16,137	12,131	75.18	11,415	70.74	4,806	29.78
ม่วงสามสิบ	31,936	26,768	83.82	26,057	81.59	17,779	55.67
เมือง	81,447	66,018	81.06	64,476	79.16	37,986	46.64
วารินชำราบ	56,525	47,190	83.49	45,379	80.28	19,736	34.92
ศรีเมืองใหม่	24,210	20,108	83.06	19,308	79.75	9,830	40.60
สว่างวีระวงศ์	10,787	9,214	85.42	8,718	80.82	3,128	29.00
สำโรง	18,689	16,254	86.97	15,541	83.16	6,181	33.07
สิรินธร	16,638	12,923	77.67	12,196	73.30	3,846	23.12
เหล่าเสือโก้ก	9,683	7,937	81.97	7,568	78.16	4,076	42.09
รวม	635,182	512,265	80.65	488,415	76.89	218,173	34.35

ผลงานและเป้าหมายการฉีดเข็ม 3 รายหน่วยบริการ

ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507


SW.๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ



จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




SW.ใช้องใน




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.ม่วงสามสิบ




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

SW.तालसुम




จำนวนการให้เพิ่ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

SW.ดอนมดแดง




จำนวนการให้เพิ่ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

sw.เหล่าเสือโก้ก




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

SW.โครงการพืชผล




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

สว.เขมราษฎร์




จำนวนการให้เพิ่ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.ศรีเมืองใหม่





จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

sw.โพธิ์ไทร




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.กุดข้าวปุ้น




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

sw.นิตา




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.วารินชำราบ




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.พิจุลมั่งสาหาร




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

สว.โขงเจียม




จำนวนการให้เพิ่ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

sw.สิรินธร




จำนวนการให้เพิ่ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.ลำโรง




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละ 3 เกือบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.นาเยี่ย




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละ 3 เกือบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.สว่างวีระวงศ์




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

SWR.เดชอูม




จำนวนการให้เพิ่ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

SW.นางะหลวย




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.น้ำยูน




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

สว.บุญทริก




จำนวนการให้เพิ่ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเพิ่ม 3 เทียบคนได้รับเพิ่ม 2 ในกลุ่ม 507

รพ.ทุ่งศรีอุดม




จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507




ร้อยละเข็ม 3 เทียบคนได้รับเข็ม 2 ในกลุ่ม 507

sw.น้ำขุ่น



จำนวนการให้เข็ม 3 และจำนวนคงเหลือคิดจากเป้าหมาย 70% ของ กลุ่ม 507



แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีอายุ 5 – 17 ปี

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3
ผู้ที่มีอายุ 5 – 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ได้กำหนด
ผู้ที่มีอายุ 6 – 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ได้กำหนด
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ได้กำหนด
ผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส**
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส
ผู้ที่มีอายุ 6 – 17 ปี	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม / ฝาสีม่วง เต็มโดส ตามช่วงอายุ

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ

* ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

** ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล

ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์

ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

แผนการจัดสรรและกลุ่มเป้าหมายสำหรับการฉีดวัคซีน Covovax ลอตบริจาค

ข้อบ่งชี้ตามเอกสารกำกับยา

- ฉีดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 18 ปีขึ้นไป
- ขนาด 0.5 ซีซี เข้ากล้ามเนื้อ โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์
- ยังไม่มีข้อมูลสำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้น

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถฉีดวัคซีน Covovax ตามการจัดสรร

- กลุ่มเป้าหมายที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติฉีดวัคซีนโควิด 19 มาก่อน
- ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น แต่มีประวัติการแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆ หรือ ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ ให้นำหน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์ ภายใต้หลักวิชาการ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

แผนการจัดสรรวัคซีน Covovax

- จัดสรรให้ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1,000 โดส (100 ขวด) สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ตามข้อบ่งชี้ตามเอกสารกำกับยา
- เริ่มจัดส่งประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2565

แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฟาสีม่วง
เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส
ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์
ครบ 2 เข็ม

จากผลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคทั้งต่างประเทศและในประเทศพบว่าระดับภูมิคุ้มกันของเด็กที่ได้รับวัคซีนจะเริ่มลดลงจนไม่สามารถป้องกันโรคได้ ภายหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สอง เป็นระยะเวลา 4-6 เดือน

จากที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็มแล้ว ให้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ขนาด โดสปกติ หรือ ครึ่งโดส มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือน ขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก ประกอบกับที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 445 วันที่ 11 เมษายน 2565 มีมติให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็มแล้ว ให้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ขนาด ครึ่งโดส มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่ 4 - 6 เดือน ขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยให้บริการผ่านระบบสถานศึกษา เพื่อเตรียมการสำหรับเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเป้าหมาย

2. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฟาสิมวง ครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 – 6 เดือน ขึ้นไป และ

2.2 เป็นผู้ที่ต้องการได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ฟาสิมวง ขนาดครึ่งโดส (15 ไมโครกรัม/โดส)

3. กำหนดการให้วัคซีน

กำหนดให้วัคซีนไฟเซอร์ฟาสิมวง เป็นเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ขนาด ครึ่งโดส (15 ไมโครกรัม/โดส) ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 - 6 เดือน ขึ้นไป

4. ระยะเวลาและพื้นที่ดำเนินการ

ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีความพร้อม สามารถให้บริการในกลุ่มเป้าหมายได้ก่อนวันดังกล่าว

5. รูปแบบการดำเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายดังข้อ 3 ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฟาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ขนาด ครึ่งโดส (15 ไมโครกรัม/โดส) ผ่านระบบสถานศึกษา (รูปแบบวัคซีนนักเรียน; School-based vaccination)

โดยประสานการดำเนินงานผ่านกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดการประสานงานเช่นเดียวกับแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

5.2 ในกรณีที่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายในข้อ 2 ได้แก่

- เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่อยู่นอกระบบการศึกษา
- ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มขึ้นไป ที่ไม่ใช่วัคซีนไฟเซอร์ทั้ง 2 เข็ม
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในระบบการศึกษา ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฟาสีม่วง ครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 – 6 เดือน ขึ้นไป และต้องการได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ฟาสีม่วง ขนาดเต็มโดส (30 ไมโครกรัม/โดส)

ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สามารถเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ฟาสีม่วงเข็มกระตุ้น ผ่านระบบสถานพยาบาลตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีอายุ 5 – 17 ปี

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3
ผู้ที่มีอายุ 5 – 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ได้กำหนด
ผู้ที่มีอายุ 6 – 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ได้กำหนด
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ได้กำหนด
ผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส**
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส
ผู้ที่มีอายุ 6 – 17 ปี	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม / ฝาสีม่วง เต็มโดส ตามช่วงอายุ

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ

* ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

** ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล

ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์

ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 1 และ 2

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้วัคซีนตามที่ใช้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4. ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 แล้ว		ระยะห่างระหว่างเข็ม		เข็มที่ 2	
		เข็มที่ 1			เข็มที่ 2
สูตรแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป		AstraZeneca	8 – 12 สัปดาห์		AstraZeneca
		AstraZeneca	4 – 12 สัปดาห์		Pfizer
		Pfizer	4 สัปดาห์		AstraZeneca
		Moderna	4 สัปดาห์		Moderna
สูตรแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 17 ปี	ผู้ที่มีอายุ 5 - 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์		Pfizer ฝาสีส้ม
	ผู้ที่มีอายุ 6 - 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์		Pfizer ฝาสีส้ม
		Sinovac	4 สัปดาห์		Pfizer ฝาสีส้ม
	ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี ***	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*		Pfizer ฝาสีม่วง
		Sinovac	4 สัปดาห์		Pfizer ฝาสีม่วง
	ผู้ที่มีอายุ 6 - 17 ปี	Sinovac**	4 สัปดาห์		Sinovac**

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ *ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

**ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม (หรือวัคซีนทางเลือก Sinopharm) ควรเข้ารับการกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer 1 เข็ม (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน)

โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

***แนะนำให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาดังแต่ 4-6 เดือน ขึ้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose)

4

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม		เข็มที่ 3
วัคซีน กระตุ้น เข็มที่ 3	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์		AstraZeneca
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป		AstraZeneca
	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer
	Pfizer	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer
	AstraZeneca	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป		AstraZeneca
วัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 4	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	4 เดือน ขึ้นไป	AstraZeneca
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	AstraZeneca	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer
	AstraZeneca	AstraZeneca	Pfizer	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1. เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีน AZ เป็นเข็มกระตุ้นได้ในผู้ที่รับการฉีด AZ ครบ 2 เข็ม โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AZ-AZ-AZ ภูมิอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน AZ-AZ-PF ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการฉีด mRNA


2. วัคซีน Moderna สามารถเป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น

กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน (ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเด็ก)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565



วัคซีนสามารถป้องกันผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิด 19 ได้ผลดีมาก

	ประวัติวัคซีน	จำนวน (ล้านคน)	จำนวนเสียชีวิต (คน)	อัตราเสียชีวิต (ต่อล้านคน)	วัคซีนป้องกันการเสียชีวิต
ไม่ได้รับวัคซีน		2.2	387	178	
		0.6	66	112	
		6.2	197	32	เสียชีวิตลดลง 6 เท่า
		3.7	16	4	เสียชีวิตลดลง 41 เท่า
รวม		12.7	666	52	

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้สูงอายุเสียชีวิต 666 ราย ระหว่างวันที่ 1 มค – 18 กพ. 65

แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

