

ประชุม กกบ.

6 ตุลาคม 2565

งานบริหารเวชภัณฑ์

1-30 กันยายน 2565

มูลค่าจัดซื้อยาเอง	947,091.66
มูลค่ารับสนับสนุนยาโควิด (บาท)	35,094.40
มูลค่ารับสนับสนุนยา ARV+TB (บาท)	66,096.08
มูลค่ารับสนับสนุนวัคซีน EPI (บาท)	143,994.58
มูลค่าจ่ายยา (บาท)	1,559,333.32
มูลค่ายากงเหลือ (บาท)	1,673,024.89
อัตราคงคลัง (เดือน)	1.07

มูลค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์เอง (บาท)	95,615
มูลค่ารับสนับสนุนวัสดุการแพทย์ (บาท)	8,860
มูลค่าจ่าย (บาท)	413,501.42
มูลค่าวัสดุการแพทย์คงเหลือ (บาท)	972,229.27
อัตราคงคลัง (เดือน)	2.35

วัคซีนโควิดตัวใหม่

ประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2565

กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-4 ปี (4 ปี 11 เดือน 29 วัน)

วัคซีน Pfizer ชนิด mRNA

เป็นวัคซีนเชื้อตาย จึงสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนเด็ก EPI ปกติได้ ฉีดคนละข้าง

ขวดฝาสีแดงเข็ม 1 ขวด ฉีดได้ 10 คน

วัคซีน บรรจุ 0.4 ml+ผสม 0.9%NSS 2.2 ml =2.6 ml

ฉีด 0.2 ml/dose (ขนาดยา 3 ไมโครกรัม/โดส) IM

เวลาผสมไม่เขย่าขวด ให้คว่ำขวดขึ้นลงเบาๆ

ฉีด 3 เข็ม

เข็ม 2 ห่างจากเข็ม 1 = 4 wk

เข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 = 8 wk

มีความปลอดภัย ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง

อาการข้างเคียงที่พบ: ปวดบริเวณที่ฉีด ใช้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

การประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 8.45 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และผ่านระบบการประชุมทางไกล



มติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 13 กันยายน 2565

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี

- กำหนดการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี (Pfizer ฝ่าสีแดงเข็ม แดงแดงเข็ม ต้องสมก่อนฉีดตามเอกสารกำกับยา)
 - ขนาดวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม)
 - กำหนดให้วัคซีน จำนวน 3 เข็ม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ดังนี้

ผู้ที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี

เข็มที่ 1: Pfizer ฝ่าสีแดงเข็ม

ระยะห่างระหว่างเข็ม: 4 สัปดาห์ (3-8 สัปดาห์)

เข็มที่ 2: Pfizer ฝ่าสีแดงเข็ม

ระยะห่างระหว่างเข็ม: 8 สัปดาห์ (อย่างน้อย 6 สัปดาห์)

เข็มที่ 3: Pfizer ฝ่าสีแดงเข็ม



Formulation สูตร	Dilute to use, 12 years and older 12 ปีขึ้นไป เจือจางก่อนใช้	12 years and older, Ready to use 12 ปีขึ้นไป พร้อมใช้	Dilute to use, 5 to 11 years old 5-11 ปี เจือจางก่อนใช้	Dilute to use, 6 months to 4 years old 6 เดือน - 4 ปี เจือจางก่อนใช้
Vial ขวด	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง
Vial Cap Color สีฝาขวด	 สีม่วง	 สีเทา	 สีส้ม	 สีแดง
Dosage โดส (ขนาดยา)	30 mcg 30 ไมโครกรัม	30 mcg 30 ไมโครกรัม	10 mcg 10 ไมโครกรัม	3 mcg 3 ไมโครกรัม
Dilution การเจือจาง	Dilution required ต้องเจือจาง	Dilution NOT required ไม่ต้องเจือจาง	Dilution required ต้องเจือจาง	Dilution required ต้องเจือจาง
Amount of Diluent Needed per Vial ปริมาณของสารเจือจางที่ต้องใช้ต่อขวด	1.8 mL 1.8 มิลลิลิตร	No dilution ไม่ต้องเจือจาง	1.3 mL 1.3 มิลลิลิตร	2.2 mL 2.2 มิลลิลิตร
Vial Size ขนาดขวด	2 mL 2 มิลลิลิตร	2 mL 2 มิลลิลิตร	2 mL 2 มิลลิลิตร	2 mL 2 มิลลิลิตร
Doses per Vial ขนาดยา (โดส) ต่อขวด	6 doses per vial (after dilution) 6 โดสต่อขวด (หลังจากเจือจาง)	6 doses per vial 6 โดสต่อขวด	10 doses per vial (after dilution) 10 โดสต่อขวด (หลังจากเจือจาง)	10 doses per vial (after dilution) 10 โดสต่อขวด (หลังจากเจือจาง)

วัคซีน Pfizer สีแดง (Maroon cap) ฉีดสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

- ขนาดวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม)
- หลังการละลายยา 1 ขวด สามารถฉีดได้จำนวน 10 โดส

เสร็จสิ้น

pf training v12.pdf



Formulation สูตร	Dilute to use, 12 years and older 12 ปีขึ้นไป เจือจางก่อนใช้	12 years and older, Ready to use 12 ปีขึ้นไป พร้อมใช้	Dilute to use, 5 to 11 years old 5-11 ปี เจือจางก่อนใช้	Dilute to use, 6 months to 4 years old 6 เดือน - 4 ปี เจือจางก่อนใช้
Vial ขวด	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง	Multi-dose Vial ขวดแก้วสำหรับใช้หลายครั้ง
Vial Cap Color สีฝาขวด	 สีม่วง	 สีเทา	 สีส้ม	 สีแดง
Refrigeration Storage Time (2 °C to 8 °C) เวลาการจัดเก็บการแช่เย็น (2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส)	1 month 1 เดือน	10 weeks 10 สัปดาห์	10 weeks 10 สัปดาห์	10 weeks 10 สัปดาห์
Freezer Storage Time (-25 °C to -15 °C) เวลาการจัดเก็บการแช่แข็ง (-25 องศาเซลเซียส ถึง -15 องศาเซลเซียส)	2 weeks within the 12-month shelf life 2 สัปดาห์ภายใน อายุการใช้งาน 12 เดือน	DO NOT STORE ห้ามเก็บ	DO NOT STORE ห้ามเก็บ	DO NOT STORE ห้ามเก็บ
ULT Freezer Storage Time (-90 °C to -60 °C) เวลาการจัดเก็บการแช่แข็ง ULT (-90 องศาเซลเซียส ถึง -60 องศาเซลเซียส)	12 months (shelf life) 12 เดือน (อายุการใช้งาน)	12 months (shelf life) 12 เดือน (อายุการใช้งาน)	12 months (shelf life) 12 เดือน (อายุการใช้งาน)	12 months (shelf life) 12 เดือน (อายุการใช้งาน)
Room Temperature (8 °C to 30 °C) อุณหภูมิห้อง (8 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส)	2 hours prior to dilution (including any thaw time) 2 ชั่วโมงก่อนการเจือจาง (รวมกับเวลาละลาย)	12 hours prior to first puncture 12 ชั่วโมง ก่อนการฉีดเข็มแรก	12 hours prior to dilution 12 ชั่วโมง ก่อนการเจือจาง	12 hours prior to dilution 12 ชั่วโมง ก่อนการเจือจาง
After First Puncture or Dilution (2 °C to 30 °C) หลังจากการฉีดเข็มหรือการเจือจางครั้งแรก (2 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส)	Discard 6 hours after dilution ทิ้งวัคซีนที่ไม่ได้ใช้ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากเจือจาง	Discard 12 hours after first puncture ทิ้งวัคซีนที่ไม่ได้ใช้ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากฉีดเข็มแรก	Discard 12 hours after dilution ทิ้งวัคซีนที่ไม่ได้ใช้ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากเจือจาง	Discard 12 hours after dilution ทิ้งวัคซีนที่ไม่ได้ใช้ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากเจือจาง
Package Size ขนาดบรรจุ	195 vials 195 ขวด	10 vials 10 ขวด	10 vials 10 ขวด	10 vials 10 ขวด

วัคซีน Pfizer สีแดง (Maroon cap) ฉีดสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

- จัดเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ -90 °C ถึง -60 °C ได้นาน 12 เดือน
- จัดเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C ได้นาน 10 สัปดาห์
- จัดเก็บในอุณหภูมิห้อง (8 °C ถึง 30 °C) ได้นาน 12 ชั่วโมง (นับตั้งแต่หลังเริ่มการละลายวัคซีน)

